УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА»
_____ А.В. Семенюга
«__» _____ 2022 года

ИНСТРУКЦИЯ
по применению добавки кормовой подкисляющей «Стабифор»

1 Состав

1.1 В 1 мл добавки кормовой содержится 486 мг муравьиной кислоты (в виде формиата аммония и муравьиной кислоты), 100 мг уксусной кислоты, 5 мг меди (в виде сульфата меди), вспомогательное вещество (вода очищенная).

2 Форма выпуска, упаковка

2.1 Добавка представляет собой жидкость от светло-синего до сине-зеленого цвета.

2.2 Добавку выпускают в полимерной упаковке по 20 и 100 мл, 1 л и 10 л, которую укупоривают полимерной крышкой.

3 Свойства

3.1 Входящие в состав добавки органические кислоты и сульфат меди подкисляют воду до значения pH=4 ед. и селективно угнетают рост патогенных бактерий, подавляют рост грибов, ускоряют ферментацию и улучшают усвояемость корма, снижают бактериальную обсемененность.

3.2 Добавка негативного влияния на непатогенную флору, в частности, лактобактерии, не оказывает. Не изменяет вкусовые качества воды.

3.3 Компоненты добавки являются естественными метаболитами обмена веществ, после попадания с водой в организм животного они легко всасываются из желудочно-кишечного тракта и полностью усваиваются.

4 Порядок применения

4.1 Добавку применяют в животноводстве и птицеводстве для подкисления воды, ускорения ферментации, улучшения усвояемости корма, повышения продуктивности и ускорения роста у птиц, поросят, телят.

4.2 Добавку применяют ежедневно или через сутки в дозе:

- 2,0 л добавки на 1000 л питьевой воды.

4.3 Запрещается использовать добавку совместно с вакцинами и другими биологически активными веществами, применяемыми с питьевой водой.

4.4 В рекомендуемой дозе добавка не оказывает побочных явлений. Запрещается применять добавку животным и птице при повышенной индивидуальной чувствительности к ее компонентам.

4.5 Добавка не обладает коррозийными свойствами на системы водоснабжения, поилки, элементы конструкции.

5 Сроки ожидания

5.1 Продукцию животноводства и птицеводства, полученную после применения добавки, разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

6 Условия и срок хранения

6.1 Добавку хранят в упаковке предприятия-производителя в защищенном от света месте при температуре от 0 °С до 35 °С.

6.2 Срок хранения добавки – два года от даты производства при соблюдении условий хранения. Не применять по истечении срока хранения.

7 Меры профилактики

7.1 При работе с добавкой следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности, применяемые при работе с кормовыми добавками.

7.2 При попадании добавки на кожу или слизистую оболочку глаз – обильно промыть проточной водой.

7.3 После окончания работы с добавкой руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать проточной водой.

8 Порядок предъявления рекламаций

8.1 В случае возникновения осложнений после применения добавки кормовой, а также несоответствия требованиям нормативных документов, ее использование прекращают, потребитель письменно сообщает об этом производителю.

Совместно проводится изучение соблюдения всех правил по применению добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия добавки на организм животных или птиц специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний с оформлением акта отбора проб. Пробы направляются в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

9 Полное наименование производителя

9.1 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЭКОТЕХНИКА», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.

Адрес производственной площадки: пер. Промышленный, 9/3, г.п. Свислочь.

Инструкция разработана сотрудниками ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА».